

Полиомиелит!!!



**ПОЛИОМИЕЛИТ –
ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
ПОРАЖАЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ,
ВЫЗЫВАЕТ ПАРАЛИЧ.**

**ВИРУС ПОПАДАЕТ В ОРГАНИЗМ
ЧЕРЕЗ РОТ И РАЗМНОЖАЕТСЯ В
КИШЕЧНИКЕ. ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ:
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА,
УСТАЛОСТЬ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ,
ТОШНОТА, БОЛЬ В КОНЕЧНОСТЯХ.**

Группа повышенного риска – в основном, дети до пяти лет.

Профилактика полиомиелита:

1. Полиовирус быстро распространяется среди неиммунизированных групп населения. Полиомиелит можно предупредить с помощью вакцинации. Прививки против полиомиелита входят в календарь профилактических прививок Республики Беларусь на плановой основе.
2. Необходимо соблюдать правила личной гигиены (мытье рук);
3. Свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой сполоснуть кипяченой или бутилированной водой.



Внимание родители! Если у ребенка возникли жалобы на нарушение походки, опоры на ноги, снижение мышечной силы в ноге или руке, он стал часто спотыкаться, "тянуть" ногу, "шлепать" ее и т. п., то следует немедленно проконсультировать ребенка у детского невропатолога.

***Своевременная вакцинация и личная гигиена
помогут Вам избежать заболевания.***

БЕРЕГИТЕ себя и своих близких!



Полиомиелит

Описание: вирусная инфекция спинного мозга, которая иногда приводит к параличу и может быть смертельной.

Что нужно знать:

- полиомиелит легко предотвратить с помощью вакцины, которая принимается внутрь (*сделайте ребенку прививку!*);
- предупредить инфекцию легче, чем вылечить;
- у большинства детей начальная стадия полиомиелита протекает как простудное заболевание.

Обратитесь к врачу, если:

- вы подозреваете у ребенка полиомиелит. Для подтверждения диагноза требуется проведение лабораторных анализов;
- непривитый ребенок имел контакт с больным полиомиелитом;
- ребенку не сделана прививка от полиомиелита.

Симптомы:

- повышение температуры;
- головная боль;
- потеря аппетита;
- рвота;
- боли в мышцах;
- параличи (на 3—7-й день болезни).

Что проверить:

- записи о сделанных прививках в медкарте.

Лечение:

- хотя вылечить полиомиелит нельзя, можно предупредить его последствия;
- тяжесть полиомиелита у разных детей различна. Отличаются и его последствия;
- заболевшему ребенку требуется госпитализация;
- если возникает подозрение на полиомиелит у больного, ранее не вакцинированного против этого заболевания, он немедленно должен быть направлен в инфекционную больницу для проведения интенсивного лечения;
- детям до 15 лет, имевшим тесный контакт с больным острым полиомиелитом, немедленно проводится вакцинация.

О несчастьях, которые нес с собой полиомиелит, наслышаны многие. В лучшем случае болезнь заканчивалась тяжелой инвалидностью, но благодаря прививкам эпидемия быстро сошла на нет. Однако для поддержания благополучной эпидемической обстановки необходимо постоянно вакцинировать каждого ребенка. Если коллективный иммунный барьер будет ослаблен из-за неполной вакцинации населения, могут возникнуть заболевания полиомиелитом.

